

TAGORE MEDICAL CENTER

KARDIOLÓGIA • BELGYÓGYÁSZAT • DIAGNOSZTIKA • ESZTÉTIKA

TÁJÉKOZTATÓ az elálló fül esztétikai plasztikai sebészeti műtétei kapcsán

A jelenség leírása:

A fülkagylók a koponyától hegyes szögben az átlagosnál jobban elállnak.

Definíció:

Veleszületetten egyik, vagy mindkét fülkagyló a koponyától hegyes szögben eláll, a fülkagyló hátsó széle legalább másfél cm-re van a koponyától.

A kórfolyamat lényege:

A porcos váz veleszületett alakváltozása miatt a fülkagyló eláll a koponyától.

Klinikai megjelenési formái:

Egyik vagy mindkét fülkagyló hegyes szögben a koponyától az átlagosnál jobban eláll.

Lehetséges plasztikai sebészeti kezelési módszerek:

Fülplasztika

A plasztikai sebészeti beavatkozás lényege, a műtét elemei és időtartama:


A műtét lényege, hogy a fülkagyló hátsó részén metszést ejtünk, szükség esetén babérlevél alakú bőrkimetszést is végzünk. A porcon a helix ívének megfelelően csík alakú bemetszéseket ejtünk, illetve porccsík kimetszését végezzük. Öltésekkel a porcot olyan helyzetben rögzítjük, hogy a fülkagyló jobban a koponyához simuljon, bőrvarrat, nyomókötés kerül elhelyezésre. A műtét időtartama kb. 1 óra.

Az érzéstelenítésről:

A fülplasztika történhet helyi érzéstelenítéssel vagy altatásban. A Tagore Medical Centerben helyi érzéstelenítéssel operálunk. Helyi érzéstelenítéskor az érzéstelenítő injekciót közvetlenül a fül bőre alá adjuk mindkét oldalról, hatása azonnal kialakul.

A műtét utáni kezelés, gyógyszerek, életmód otthon, orvosi ellenőrzés:

A műtőben felhelyezett kötést a páciens távozása előtt az orvos ellenőrzi. A műtét utáni időszakban kerülni kell a fokozott fizikai terhelést, a fül megütését és minden olyan tevékenységet, ami vérnyomás emelkedéssel járhat. Fontos, hogy állandóan steril kötés legyen a füleken. A műtét utáni kezelésben az operáló orvos utasításaitól eltérni nem lehet. A kezelés módosítására vagy kiegészítésére csak a kezelőorvos adhat engedélyt. A műtét utáni orvosi ellenőrzés időpontját a kezelőorvos határozza meg. A műtét és az ellenőrzés



TAGORE MEDICAL CENTER

KARDIOLÓGIA • BELGYÓGYÁSZAT • DIAGNOSZTIKA • ESZTÉTIKA

időpontja között felmerülő probléma esetén helyes, ha a páciens az orvosához fordul tanácsért.

Milyen tünetek észlelésekor kell azonnal a kezelőorvoshoz fordulni?

Vérzés esetén, illetve a fülkagyló lüktető fájdalma, váladékozása, láz esetén fel kell keresni az operáló orvost.

A sebgyógyulás időtartama:

A rendezett körülmények között élő, lakásban nem egyedül tartózkodó, az orvosi utasításokat betartó, kommunikációra képes páciens esetén a fülplasztika nem igényel kórházi ápolást. A műtét után, néhány órás megfigyelés után a páciens hazabocsátható.

A sebgyógyulás időtartama 12-14 nap, varratszedés után pár nappal az esetleges duzzanat megszűnik.

A beavatkozás elvégzésének feltételei:

A páciens teljes szellemi és fizikai jólléte, negatív laboratóriumi eredmények. A páciens kellő felvilágosítás után a műtét beleegező nyilatkozatot aláírta (kiskorú esetén szülő vagy gondviselő) .

Műtégi indikáció:

Fülplasztika műtét indikációját a páciens (szülő) állítja fel.

Műtégi kontraindikáció:

Nem végezhető fülplasztika akkor, ha a műtét előtti kivizsgálás kóros laboratóriumi elváltozásokat mutat, belgyógyászati betegség esetén, illetve ha a páciens elvárásai irreálisak.

A műtét általános és speciális kockázati tényezői, lehetséges szövődmények:

Fülplasztika műtete után kialakulhat vérzés és gyulladás.

A fülplasztika helyett alkalmazható lehetséges alternatív megoldások:


A műtéttel szemben alternatív megoldás nincs.

A fülplasztika várható eredménye:

A fülkagylók az átlagosnak megfelelően a koponyához simulnak, és kialakul a megfelelő porcos ív a fülkagyló elülső felszínén.

A fülplasztika következményei:


Közvetlenül a műtét után fájdalom lép fel, a fülkagyló duzzadt. A műtét következtében vékony heg marad vissza.



TAGORE MEDICAL CENTER

KARDIOLÓGIA • BELGYÓGYÁSZAT • DIAGNOSZTIKA • ESZTÉTIKA

Tagore Medical Center * CARDIOMOBILE Kft.
Székhely: 8229 Csupak, Király utca 4. *Telephely: 8230 Balatonfüred, Gyógy Tér 3. *
Tel: 06-20-280-3939 * Email: info@tagoremed.hu
www.tagoremed.hu



TAGORE MEDICAL CENTER

KARDIOLÓGIA • BELGYÓGYÁSZAT • DIAGNOSZTIKA • ESZTÉTIKA

Kötelező utánvizsgálat és rendszeres ellenőrzés:

A páciens az orvosi utasításokat betartja, a kezelőorvos által meghatározott időpontban megjelenik. Varratszedés után még 3-4 hétig alvás esetén a fülkagylókat egy pánttal óvni kell az esetleges előre gyűrődéstől, hogy a porc az új helyzetében megfelelően összehegesedhessen.